

# **PORTAINJERTOS Y VARIEDADES**

**INSTITUTO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AGROALIMENTARIO Y FORESTAL DE CASTILLA LA MANCHA (IRIAF)**

**CONSEJERÍA DE AGRICULTURA  
JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA**



# LOS PORTAINJERTOS



# CORNICABRA (*Pistacia terebinthus* L.)



# DIFERENCIA DE VIGOR



# LA IMPORTANCIA DEL MANEJO EN VIVERO



# PLANTACIONES DE CORNICABRA INJERTADA EN CAMPO SELECCIONADA Y BIEN REPICADA



# ATLÁNTICA (*Pistacia atlántica* D.)



# INTEGÉRRIMA (*Pistacia integerrima* S.)



# PATRÓN FRANCO (*Pistacia vera* L.)



# UCB1 (*Pistacia atlántica* D. x *P. integerrima* S.)



# OTROS HÍBRIDOS (1)

*Pistacia terebinthus* x *P. atlantica*



*Pistacia terebinthus* x *P. integerrima*



*Pistacia terebinthus* x *P. vera*



*Pistacia atlantica* x *P. vera*



# OTROS HÍBRIDOS (2)

*Pistacia vera* x *P. terebinthus*



# PRENDIMIENTO DEL INJERTO

Sea cual sea el portainjerto a injertar y su vigor, si las temperaturas son las ideales y los pies se injertan con un diámetro y alturas similares, el prendimiento será similar

Si la población de un portainjerto es homogénea, se podrán injertar la mayor parte de individuos a la vez


Si la población es heterogénea solo se injertarían con garantía aquellos que posean el diámetro adecuado a la altura convenida

Si optamos por la cornicabra como portainjerto, debemos exigir al vivero planta lo más homogénea posible para reducir los costes derivados de alternar el injerto en función del grosor que posean en ese momento

# COMPORTAMIENTO EN SECANO DE LOS PORTAINJERTOS



# COMPORTAMIENTO EN REGADÍO DE LOS PORTAINJERTOS



# RESULTADOS ENSAYO REGADÍO

Tratamiento	Producción <sup>1</sup> (Kg/ha)	Agua consumida (m <sup>3</sup> /ha/año)
C	3.700	5.470
T1	3.100	3.250
T2	3.040	3.000

**C = Control, 100% ETc, corregido con potencial hídrico tronco**

**T1 = Potencial -15 bares, en fase 2**

**T2 = Potencial -18 bares, en fase 2**

<sup>1</sup>Pistachos en cáscara, pelados y secos al 6% de humedad

Año	Portainjerto	Peso seco					Diámetro de los frutos abiertos (mm)
		Peso del grano en frutos abiertos (g)	Peso del grano en frutos cerrados (g)	Porcentaje			
				Abiertos	Cerrados	Vacíos	
2012	TEREBINTO	0.6593A	0.5934B	↑ 59.31a	↑ 24.54b	↑ 16.15	12.98
	ATLÁNTICA	0.6421A	0.5648B	57.06a	25.51ab	17.44	12.76
	INTEGÉRRIMA	↓ 56.71A	↓ 60.54B	44.20b	34.50a	21.30	13.07
2013	TEREBINTO	0.7185A	0.5589B	64.57	↑ 27.00	9.63	14.54
	ATLÁNTICA	↓ 71.93A	0.5822B	↑ 55.41	27.92	↑ 6.67	14.30
	INTEGÉRRIMA	0.6973A	↓ 63.38B	53.19	37.47	9.35	14.34
2014	TEREBINTO	0.6394a	0.6224	↑ 72.61a	↑ 18.69	↑ 8.69	13.26ab
	ATLÁNTICA	↓ 64.54a	0.6304	59.83ab	30.02ab	10.16	13.32a
	INTEGÉRRIMA	0.6160bB	↓ 64.59 A	47.85b	39.69a	12.47	13.09b
Media	TEREBINTO	↓ 67.44A	0.5751aB	↑ 55.73	↑ 22.76	11.51	13.61
	ATLÁNTICA	0.6689A	0.5924abB	60.77a	27.81b	↑ 11.42	13.46
	INTEGÉRRIMA	0.6601A	↓ 62.84aB	↓ 48.41	↓ 37.22	14.37	13.50

# EFICIENCIA NUTRICIONAL DE LOS PORTAINJERTOS

## ELEMENTOS ENCONTRADOS EN MAYOR PORPORCIÓN

SOBRE <i>Pistacia terebinthus</i>	SOBRE <i>Pistacia atlantica</i>	SOBRE <i>Pistacia integerrima</i>
Nitrógeno	Zinc	
Hierro	Fósforo	
Boro		
Potasio		
Cobre		
Manganeso		

# TOLERANCIA A DIFERENTES FACTORES LIMITANTES

## Tolerancia\* a diferentes factores limitantes de 4 portainjertos de pistachero injertados con Kerman

Portainjerto	Factores estudiados					
	Frío	Producción	Salinidad	Verticillium	Armillaria	Phytophthora
<i>P. terebinthus</i>	1	-	-	-	1	-
<i>P. atlantica</i>	2	3	3	3	3	1
<i>P. integerrima</i>	4	4	1	1	3	3
PG II	3	2	-	4	3	-
UCB1	3	1	2	1	1	1

\* Valoración desde 1 (más tolerante) a 4 (menos tolerante)

- Sin datos

FUENTE: Ferguson, L.; Sanden, B.; Grattan, S.; Epstein, L.; Krueger, B. (2005). Pistachio Rootstocks, *in*: Pistachio Production Manual (fourth edition). Fruit and Nut Research and Information Center. Department of Plant Sciences. University of California. Davis. 293 pp.

# LA IMPORTANCIA DEL PERIODO EN EL QUE EL ÁRBOL ESTÁ ACUMULANDO RESERVAS (CICLO)

**CASTILLA LA MANCHA**

**CALIFORNIA**

Demanda Hídrica Anual

**5.000 m<sup>3</sup>/ha/año**

**10.000 m<sup>3</sup>/ha/año**

Periodo Medio de Recolección

**Octubre** (Nov. en Castilla y León)

**Agosto**

Duración del Periodo de Extracción de Yemas Aptas para el injerto

**2 años después del injerto**

**6 años después del injerto**

Prendimiento Medio del Injerto en Campo (1 injertada)

**60%**

**80%**

# ¿QUÉ HAY TIPO DE PRODUCCIÓN HAY QUE POTENCIAR?

## CUALIDADES A POTENCIAR EN LOS PISTACHOS PARA SNACK

1) **SABOR (Secano)**

2) **APERTURA NATURAL (Riego)**  
+ **Riego – Sabor (suelos profundos)**

## PRODUCCIONES DE MAYOR VALOR A MEDIO Y LARGO PLAZO

1) **¿PRIORIZAMOS LA CANTIDAD?**

2) **¿PRIORIZAMOS LA CALIDAD? (Organoléptica y fitosanitaria)**

# ¿PARA QUÉ NECESITAMOS UN EXCESO DE VIGOR EN LOS PORTAINJERTOS?

**SI PRIORIZAMOS CANTIDAD NECESITAREMOS PORTAINJERTOS DE CIERTO VIGOR, PERO SOLO SI DISPONEMOS DE:**

**Suelos profundos**

**Agua abundante**

**Zonas de ciclo largo**

**PERO SI PRIORIZAMOS CALIDAD, EL VIGOR CARECERÁ DE IMPORTANCIA Y PODRÍAMOS CULTIVAR EN LAS SIGUIENTES CONDICIONES:**

**Secano**

**Regadío con RDC (Riego Deficitario Controlado)**

**Utilizando portainjertos de vigor medio**

# ¿*Pistacia integerrima* (PGI) o UCB1?


En Madera (California) no se encontraron diferencias significativas para el rendimiento por hectárea, tamaño del fruto o en el porcentaje de frutos abiertos entre *Pistacia integerrima* y el UCB1 con las variedades Kerman, Golden Hills o Lost Hills

CARACTERÍSTICA	PORTAINJERTOS				
	<i>P. integerrima</i>	<i>P. terebinthus</i>	<i>P. atlantica</i>	<i>P. vera</i>	Híbridos
Producción*	Baja	Media	Media	Media	SD
Producción**	Media Alta	Baja	Baja	SD	UCB1 Elevada, PGII Media Baja.
Vigor	Alto	Moderado	Moderado-alto	Bajo <sup>(2)</sup>	Alto (UCB1 y PGII).
Precocidad en la entrada en producción	Alta	Baja	Baja	Baja	Alta en PGII y Muy alta en UCB1.
Afinidad en el injerto	Buena	Buena	Buena	Buena	Alguna incompatibilidad.
Longevidad	SD	Elevada	Elevada	Elevada	SD
Resistencia al frío	Muy sensible	Muy elevada	Elevada	Elevada	UCB1 más resistente que <i>P. integerrima</i> pero menos que <i>P. atlantica</i> , PGII menos resistente que UCB1.
Resistencia a las bajas temperaturas del suelo (2 – 0 °C) <sup>(3)</sup>	Muy sensible	Elevada	Media	Elevada	SD
Resistencia a la salinidad <sup>(4)</sup>	Baja	SD	Buena	SD	Buena en UCB1.
Resistencia a la caliza	Buena	Buena	Buena	Buena	Buena
Rusticidad	Baja	Elevada	Buena	Buena	UCB1 más rústico que <i>P. integerrima</i> .
PLAGAS Y ENFERMEDADES					
Resistencia a nematodos	SD	Buena	SD	Baja	SD
Resistencia a armillaria <sup>(5)</sup>	Regular	Buena	Mala	Regular	Buena en UCB1, regular en PGII.
Resistencia a phytophthora <sup>(5)</sup>	Regular	Buena	Muy buena	Mala	SD
Resistencia a <i>Verticillium dhaliae</i> Kleh. <sup>(5)</sup>	Más resistencia que UCB1 pero menos producción que los UCB1 infectados.	Susceptible	Susceptible	Susceptible	UCB1 moderada tolerancia pero los árboles reducen su vigor y son más pequeños con la infección; PGII Susceptible.
EFICIENCIA NUTRICIONAL**					
Absorción de cobre	Baja	Elevada	Media	SD	PGII Elevada y UCB1 Baja.
Absorción de zinc	Elevada	Media Alta	Media Baja.	SD	PGII Media Alta y UCB1 Baja.
Absorción de boro	Menos que <i>P. atlantica</i> .	Media	Buena	SD	PGII Media y UCB1 Baja.
Absorción de cloro	Elevada	SD	Media Alta.	SD	UCB1 Media Baja.
Absorción de sodio	Elevada	SD	Media Alta.	SD	UCB1 Baja.



# LA SALINIDAD





# GRADO DE RESISTENCIA ORIENTATIVO ENTRE PORTAINJERTOS

UCB1 > PGI > PGII > Atlántica



# LAS VARIEDADES

# PARCELA DE VARIETADES DEL CIAC EL CHAPARRILLO (IRIAF)



# KERMAN



# LARNAKA




# AVDAT



# SIRORA



# AEGINA



# GOLDEN HILLS





# VE CERÍA

Vecería<sup>1</sup>. Medias del periodo 2001/2010 sobre *P. terebinthus* L. Año medio del injerto: 1993

Variedad	Índice de vecería
Larnaka	0,180 a
Avdat	0,185 a
Ashoury	0,213 a
Kerman	0,496 b
Avidón	0,764 d

(1) Medias con la misma letra no difieren significativamente ( $\alpha = 0,05$ )

# VARIEDADES IRANÍES DE GRAN INTERÉS PARA ESPAÑA

Variedad
Fandoghi 48 (Tamaño del fruto)
Fandoghi Riz (Producción/ha)
Kalleh Ghouchi (Tamaño del fruto)
Ahmad Aghae ( % frutos abiertos)
Akbari (Tamaño del fruto, floración tardía)
Badami Zoodrass (Maduración temprana, producción)
Badami Zarand (Producción/ha)
Ohadi

# CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIEDADES ESTUDIADAS EN EL CAC

CULTIVAR	TAMAÑO DE FRUTO	FORMA DEL FRUTO	RENDIMIENTO GRANO/CÁSCARA	VACÍOS	DEHISCENCIA	VIGOR	FLORACIÓN	PERÍODO JUVENIL	PRODUCTIVIDAD	VEGERÍA	BLANCURA CÁSCARA*
<b>Aegina</b>	Mediano	Alargado	Medio	Medio	Media	Medio	Temprana	Mediano	Alta	Media	4
<b>Ajamy</b>	Mediano-Grande	Ovalado	Alto	Medio	Alta	Alto	Media	Mediano	Baja	Media	3
<b>Ashoury</b>	Mediano	Alargado	Bajo	Alto	Alta	Alto	Temprana	Mediano	Media	Media	2
<b>Avdat</b>	Mediano	Alargado	Medio	Medio	Alta	Alto	Temprana	Mediano	Media	Media	3
<b>Avidon</b>	Pequeño	Ovalado	Bajo	Medio	Alta	Bajo	Media	Mediano	Baja	Alta	1
<b>Batoury</b>	Grande	Alargado	Medio	Alto	Baja	Medio	Temprana	Corto	Media	Baja	3
<b>Boundoky</b>	Pequeño	Ovalado	Alto	Alto	Baja	Alto	Media	Largo	Baja	Media	2
<b>Bronte</b>	Pequeño	Alargado	Bajo	Alto	Baja	Medio	Media	Largo	Baja	Media	3
<b>Iraq-2</b>	Mediano	Alargado	Bajo	Medio	Alta	Bajo	Temprana	Mediano	Baja	Media	3
<b>Joley</b>	Mediano	Alargado	Alto	Bajo	Alta	Medio	Media	Mediano	Alta	Alta	2
<b>Kastel</b>	Grande	Redondo	Alto	Medio	Alta	Medio	Tardía	Mediano	Media	Media	5
<b>Kerman</b>	Grande	Redondo	Alto	Alto	Baja	Medio	Tardía	Corto	Media	Alta	5
<b>Larnaka</b>	Mediano-Grande	Alargado	Medio	Bajo	Alta	Medio	Temprana	Mediano	Alta	Media	2
<b>Lathwardy</b>	Pequeño	Alargado	Alto	Medio	Baja	Medio	Media	Mediano	Alta	Baja	2
<b>Mateur</b>	Mediano	Alargado	Medio	Medio	Media	Alto	Temprana	Largo	Alta	Media	2
<b>Napoletana</b>	Mediano	Alargado	Alto	Alto	Baja	Medio	Media	Largo	Baja	Media	3
<b>Ouleimy</b>	Mediano	Alargado	Bajo	Medio	Baja	Alto	Media	Mediano	Baja	Media	3
<b>Sfax</b>	Pequeño	Alargado	Medio	Medio	Media	Medio	Media	Mediano	Media	Media	3
<b>Sirora</b>	Mediano-Grande	Alargado-Redondo	Medio	Medio	Alta	Alto	Media	Corto	Alta	Media	3

\* Valoración subjetiva desde 5 (máxima blancura-Kerman o Kastel) a 1 (mínima-Avidon).